



STA®-LIATEST® FM

DIAGNOZUOTI DIK – GYVYBIŠKAI SVARBU

DIK yra įgytas sindromas, sukeliantis pernelyg didelę sisteminę krešėjimo aktyvaciją. Tai sukelia suvartojimo koagulopatiją, susijusią su pernelyg didele trombino ir fibrino formavimu bei per dideliu trombocitų, krešėjimo faktorių ir inhibitorinių sistemų suvartojimu.

Šis procesas gali sukelti išplitusių trombozių (mikrovaskulinių trombų) susidarymą su hemoraginiais požymiais, galinčiais sukelti organų nepakankamumą ir riziką susirgti daugybinio organų disfunkcijos sindromu (DODS).

SISTEMINĖ KREŠĖJIMO AKTYVACIJA

INTRAVASKULINIO FIBRINO
SUSIDARYMAS

TROMBOCITŲ IR KREŠĖJIMO
FAKTORIŲ SUVARTOJIMAS

TROMBOZIŲ SUSIDARYMAS
(mažos ir vidutinio dydžio kraujotakų krešuliai)

HEMORAGINIAI ĮVYKIAI

AUDINIŲ IŠEMIJA IR
ORGANŲ NEPAKANKAMUMAS

PAGRINDINĖS DIK PRIEŽASTYS:

- Sepsis ir septinis šokas
- Akušerinės komplikacijos
- Piktybiniai navikai
- Apsinuodijimas (nuodai, narkotikai ir kt.)
- Audinių pažeidimai (daugybinės traumos, dideli nudegimai ir kt.)
- Sunkus kepenų nepakankamumas
- Imunologiniai sutrikimai

STA®-LIATEST® FM: PATIKIMOMS DIK DIAGNOZĖMS



UAB „Diagnosticinės sistemos“
Kalvarijų Sodų 1-oji g. 2, Vilnius, LT-08315 Vilnius
Tel. +370 5 274 04 94, faks. +370 5 277 76 20
El. p.: diagnostines.sistemas@diagsis.com